TEMEPHOS 50% EC

Concentré émulsifiable pour le traitement des gîtes larvaires de moustiques
Contient : 500 grammes par litres de Téméphos

MODE D'EMPLOI :

Application sur eaux stagnantes :
Le Téméphos doit être dilué dans de l'eau propre. Utiliser 1 litre de concentré pour au moins 200 litres d'eau. Toujours ajouter le concentré à l'eau et mélanger. Préparer une solution fraîche à chaque usage, ne pas stocker de produit dilué. Convient pour une utilisation à l'aide de pulvérisateurs à compression manuelle. Le Téméphos 50% EC peut être également utilisé en UBV après dilution dans du kérosène.

Type d'eau à traiter	**ml de Téméphos 50% EC par hectare**
Eaux stagnantes propres	100 – 150
Eaux stagnantes polluées	400 – 1000

Application sur cours d'eau :
Le Téméphos peut être appliqué sans dilution dans des eaux courantes : rivières et ruisseaux. Pour le contrôle des simulies appliquer quand les larves mesurent de 0,5 à 1cm de longueur. Appliquer de manière à obtenir une concentration de 0,3ppm pendant 15 à 20 minutes. La quantité de Téméphos à ajouter dépend du débit du cours d'eau.

Débit moyen du cours d'eau (m^3/sec.)	**ml de Téméphos 50% EC pour une concentration à 0,3ppm pendant 30 minutes.**
0,5	580
1,0	1150
2,0	2300
3,0	3460

Le Téméphos 50% EC doit être mélangé dans un peu d'eau et épandre sur le cours d'eau à partir d'un container muni d'une vanne réglée pour se vider en 20 – 30 minutes. De manière à obtenir un meilleur mélange, introduire le Téméphos au niveau d'une section turbulente du cours d'eau. Utiliser deux containers si le cours d'eau est large. Renouveler les applications de Téméphos aussi souvent que nécessaire afin de contrôler les générations ultérieures de larves.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Utiliser uniquement comme indiqué. Conserver dans le récipient d'origine dans un endroit frais et sec.
- Conserver hors de la portée des enfants et des animaux.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux.
- Ne jamais conserver de produit dilué mais préparer une nouvelle solution à chaque usage.
- Toxique pour les oiseaux et les abeilles. Ne pas appliquer là où les abeilles butinent activement.
- Le Téméphos peut être dangereux si avalé / absorbé via la peau ou inhalé et peut causer une irritation de la peau et des yeux. Porter des vêtements de protection adéquats, les laver immédiatement après usage.
- Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'utilisation du produit.
- Emballages vides : rincer et rendre inutilisable, ne pas réutiliser pour stocker de l'eau ou des aliments.

INSTRUCTIONS POUR PREMIERS SECOURS
- Rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes en cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau. Consulter un médecin. Si ingéré / inhalé, induire le vomissement (le patient doit être conscient). Consulter un médecin.

- CONSULTER UN MEDECIN IMMEDIATEMENT DANS TOUS LES CAS DE SUSPICION D'EMPOISONNEMENT.
- Note pour le médecin : le Téméphos est un composé organophosphoré pouvant provoquer une inhibition de la cholinestérase. Antidote : Atropine.

ALM INTERNATIONAL S.A.

Formulé pour